

人手が足りずに作業に困惑しているあなたに朗報です！！

久留米交配 「夏秋明快1号」 (交-56)

- ★枝の動きゆっくりで手間要らず
- ★ベト、ウドンコ病に強くタンソ病の広がりも少ない
- ★果色、テリ良く果実のまとまり抜群
- ★露地キュウリにはなかったイボの高さで新鮮さアピール
- ★ズッキーニ黄斑モザイクウイルス病 (ZYMV) 抵抗性品種

最近お盆まで栽培できなくなったあなたにはこちら！！

久留米交配 「夏秋明快2号」 (交-57)

- ★ビュースター、ステータス夏Ⅲ並みのスタミナ
- ★ベト、ウドンコ病に強くタンソ病の広がりも少ない
- ★夏場の短形果を克服
- ★ズッキーニ黄斑モザイクウイルス病 (ZYMV) 抵抗性品種

【特 性】

	雌花連続性	樹 勢	葉	収 量	病 気	果 長	イボ
夏秋明 快1号	5月播き—主枝60~70% 子枝70~80%	ゆっくり ↓	厚実のあ る黒中葉	中 ↓ 多	諸病害及 びZYMVに 強い	21~2 2cm	高
	6~7月播き—主枝40~50% 子枝60~70%						

	雌花連続性	樹 勢	葉	収 量	病 気	果 長	イボ
夏秋明 快2号	4~5月播き—主枝50~60% 子枝70~80%	スムーズ ↓	黒中葉	中 ↓ 多	諸病害及 びZYM Vに強い	22~2 3cm	中
	6~7月播き—主枝40~50% 子枝60~70%						

【適 応 作 型】

夏秋明快1号・・・ 普通露地栽培～露地抑制栽培

夏秋明快2号・・・ 露地全般

【栽培上の注意点】

- ・夏秋明快1号については、枝の動きがゆっくりの為枝の摘み急ぎに気をつける。どちらかという放任気味の管理とし、枝の動きが遅い場合は、主枝の果実を8~10節まで摘果するのが望ましい。
 - ・夏秋明快2号については、基本的には子枝1~2節摘みとし、孫枝からは半放任とするが、込み合えば適宜、摘芯する
 - ・どちらの品種も水分を必要とするため、果実が太り始めたら定期的に灌水をこまめに行なう
 - ・肥料については、10a当たりN成分で0.5~1kg行い、その後果実肥大にあわせて加減する
 - ・ZYMVには抵抗性であるが他のウイルスには抵抗性でないため、定期的に防除は行なう
- ※若干ギザ葉の発生があるので、定植時よく観察し、定植しないようご注意ください